

TALLER EMERGENCIAS  
INFANTILES

# MÓDULO 1

[www.infantium.cl](http://www.infantium.cl)  
[contacto@infantium.cl](mailto:contacto@infantium.cl)



# Actitud personas frente al abordaje de una emergencia (estadísticas OMS)

Confusión 20%

Indiferencia 60%



Calma y  
resolutividad

20%



## Horarios de Mayor Frecuencia Lesiones

- Entre las 8:00 y las 9:00 hrs



- Entre las 17:00 y las 19:00 hrs




## Períodos de Mayor Frecuencia Lesiones

- En verano, cuando los niños y niñas, juegan al aire libre y es más difícil vigilarlos.



- Cuando la familia pasa por momentos difíciles.  
(Fallecimiento, separación, etc)



¿Que debo hacer  
en caso de  
urgencia?




# BOTIQUÍN

Suero Fisiológico



Sutura Adhesiva



Guantes Desechables



Apósito Estéril



Alcohol Gel



Gasa Estéril



Pinzas



Tijeras



Venda Gasa Elasticada

Tela Adhesiva




Compresa Frío Instantáneo



Baja Lengua /  
Inmovilizador  
dedo



Parche curita




# OXÍMETRO



Paciente	Saturación
Prematuro de <1200 gr o < 32 sem de gestación	88 – 92%
Prematuro de >1200 gr o >32 sem de gestación	88 – 94%
Neonato	92 – 96%
Niños	> 95%
Adultos	> ó = 95%
Personas mayores o fumadores	92 – 95%
Paciente con patología pulmonar crónica	92 – 95 %

EDAD	F. CARDIACA pp/min
Prematuro	150 ± 20
Recien Nacido	130 ± 20
6 Meses	125 ± 20
1 Año	120 ± 20
2 Años	105 ± 25
3 Años	100 ± 15
5 Años	90 ± 10
12 Años	70 ± 17
15 Años	75 ± 5



Temperatura Axilar	Rango	Recomendación
Normal	36° - 36,9°	-
Normal en Recién Nacidos	36° - 37,5°	-
Sub-Febril	37,5° – 37,9°	Desabrigar y verificar que no aumente.
Fiebre	38° – 39,9°	Medios físicos (baño y/o paños de agua tibia)
Hiperpirexia	> 40°	Llevar a Urgencias.

## HEMORRAGIA O SANGRAMIENTO



1	Mantener al niño o niña lo más quieto posible.
2	Aplicar gasa directamente sobre herida y presionar por 5 minutos.
3	Aunque la sangre traspase la gasa no la retire y ponga otra gasa encima de la primera y así sucesivamente manteniendo la presión inicial.
4	Cuando el sangramiento haya cesado, realizar vendaje.


## HEMORRAGIA NASAL



- 1** Haga que el niño o niña incline la cabeza al lado contrario de salida de la sangre.
- 2** Apretar nariz durante 5 minutos mientras se respira por boca, o presionar la fosa nasal por donde sale la sangre.
- 3** No está recomendado taponear con gasa o algodón.

## CORTES


1	Evaluar si mide más de 4 cm y si tiene bordes irregulares.
2	Manejar el sangramiento.
3	Una vez controlado el sangramiento proceder con sutura adhesiva o steri strip.
4	Corte en labios, parpados o cejas no se pueden manejar en el domicilio.
5	Objetos incrustados, como vidrio, alambre no se deben sacar. Se traslada con ellos



## GOLPES EN LA CABEZA

### Signos peligrosos

- Aumento de sueño.
- Vómitos.
- Debilidad de brazos y piernas.
- Dificultad para hablar, ver u oír.
- Dolor de cabeza.
- Irritabilidad
- Convulsión



## GOLPES EN LA CABEZA



1	Aplique de forma intermitente compresa fría o bolsa de hielo para reducir la inflamación durante 15 minutos.
2	En la noche despierte a la niña o niño cada 2 hrs, para asegurar nivel de conciencia (siempre que lo haya visto un médico).
3	Todo niño o niña que ha recibido un golpe en la cabeza grave, debe consultar al servicio de urgencia.
4	Durante el traslado debe mantener su cuello sujeto con las manos y ropas, acostado e inclinado hacia un lado por posible vómito.
5	No debe ingerir nada en el momento ni siquiera agua.

## FRACTURAS

Características:

- Dolor Intenso
- Pérdida del eje
- Dificultad en movimiento



<b>1</b>	Jamás tratar de colocar el hueso en su lugar o ponerlo en otra posición.
<b>2</b>	Evitar todo tipo de movimiento de la zona lesionada e inmovilizar antes de trasladar.
<b>3</b>	Acompañar en todo momento al niño o niña, manteniéndolo abrigado.
<b>4</b>	No dar de beber ni comer en ese momento.



## FRACTURAS / ENTABLILLADO

1	Inmovilizar hueso fracturado a través de tablilla.
2	Cualquier objeto rígido puede servir: varillas, tabla de madera, diario doblado, paraguas, libros rígidos.
3	Poner gasa o tela (toalla, polera, mantel) de contacto entre la piel y la tablilla.
4	Amarrar entablillado firme pero no fuerte con lo disponible, de distal a proximal (desde la punta hacia el cuerpo)



## PICADURAS DE INSECTOS

1	Quitar aguijón con una pinza desde la base.
2	Lavar picadura con agua y jabón neutro.
3	Aplicar hielo en forma intermitente.
4	Si nota demasiada hinchazón de cualquier parte de la niña o niño, en especial párpados, labios o lengua, consulte a un centro de salud.



# ARAÑA DE RINCÓN



## ¿CÓMO RECONOCERLA?

- COLOR CAFÉ OSCURO
- PATAS ALARGADAS
- 1 A 3 CMS APROX.
- CORRE VELOZMENTE

## SÍNTOMAS DE MORDEDURA

Color violáceo en el centro de la mordida

- Dolor intenso
- Hinchazón
- Quemazón
- Sudoración
- Fiebre
- Náuseas y vómitos

## ¿QUÉ HACER FRENTE A UNA MORDEDURA?

Acudir a un centro de salud antes de **24 HORAS** y atrapar al arácnido para identificación

## IMPORTANTE

- **NO** SUCCIONAR LA PICADURA
- **NO** FORZAR SANGRADO
- **NO** TOCAR LA PIEL
- **NO** APLICAR TORNIQUETES

# QUEMADURAS

**Quemaduras de Primer Grado:** solo afectan a la capa más superficial de la piel, y se caracterizan por un enrojecimiento de la piel que duele al contacto, comúnmente las encontramos cuando la persona ha tenido una exposición prolongada al sol.

**Quemaduras de Segundo Grado:** son un poco más profundas, y su característica principal es la aparición de ampollas.

**Quemaduras de Tercer Grado:** en estas quemaduras podemos ver tejido carbonizado, las terminaciones nerviosas encargadas de transmitir el dolor se destruyen, de ahí que se diga que las quemaduras de tercer grado no duelen.



Primer Grado



Segundo Grado



Tercer Grado

## QUEMADURAS

1	Aplicar agua fresca de manera prolongada sobre la quemadura hasta que pase el dolor o 10 min.
2	Si es posible retirar la ropa, si esta adherida no realizar esta acción.
3	Secar la zona afectada y cubrir con gasa estéril.
4	Agua fría limpia sobre la gasa evitando que se adhiera a la herida.
5	Nunca aplicar ungüentos, medicamentos ni yerbas en la quemadura.



## INTOXICACIONES

<b>1</b>	No dar nada de beber.
<b>2</b>	No inducir ni evitar vómito
<b>3</b>	Comunicarse con centro de toxicología de la Universidad Católica <b>CITUC</b> <b>(+56 2) 2635 3800.</b>

