



TALLER EMERGENCIAS
INFANTILES

MÓDULO 2

www.infantium.cl
contacto@infantium.cl

O V A C E

Obstrucción de la Vía Aérea por Cuerpo Extraño.

- La obstrucción completa de la vía aérea es una emergencia que resulta en muerte dentro de minutos si no es tratada
- Factores de Riesgo:
 - Pedazos grandes de comida poco masticados.
 - Niveles elevados de alcohol en la sangre.
 - Dentaduras postizas.
 - Llorar, reír o hablar mientras se tiene en la boca comida u otro cuerpo extraño.
 - Exploración de elementos pequeños en bebés.

SJM: Muere atragantado con hamburguesa porque nadie lo auxilió

No había terminado de dar los primeros bocados cuando empezó a tambalearse en el camino, los testigos sorprendidos solo atinaron a mirarlo.

Menor de dos años muere asfixiado con un globo

Sus abuelos lo auxiliaron, pero al llegar al centro de salud, solo certificaron su deceso

Foto: Bernardo García

Muere atragantado por pedazo de carne

[Seguridad]
Por Bernardo García
12/01/2016 - 04:09 AM

Salttilo, Coahuila. - Un hombre de 50 años perdió la vida esta noche aparentemente por asfixiarse con una pieza de comida, la cual cenaba en

10536lec

SANTA FE

Tragedia en Santa Fe: murió un nene atragantado con una salchicha

El pequeño tenía dos años. Aunque fue trasladado al hospital rápidamente, los médicos confirmaron que murió por "asfixia por obstrucción en vías respiratorias aéreas superior".

Platzi




OVACE ADULTO

- ▶ Si la víctima **NO** logra contestar a la pregunta (o únicamente gesticula).
- ▶ Procederemos a realizar la maniobra de **Heimlich**



Si la víctima **logra hablar** (aunque sea con dificultad) significa que su vía aérea **NO** se encuentra completamente obstruida.



MANIOBRA DE HEIMLICH



Embarazadas



Si está sólo



OVACE en Niños desde 1 año apróx



OVACE en lactantes o niños de Contextura Pequeña

- El lactante **NO** hará el "gesto universal de asfixia", por lo que deberemos buscar :
 - Incapacidad de llorar o emitir sonidos.
 - Gemidos o llanto agudo.
 - Dificultad para respirar.
 - Color azul de labios y/o mejillas.

5 Golpes en la Espalda




5 Compresiones en el Pecho



RCP

Reanimación CardioPulmonar



RCP

Reanimación CardioPulmonar

POSICION LATERAL SEGURIDAD



Comprobar con frecuencia la respiración

CADENA DE SUPERVIVENCIA Mayores de 8 años



Reconocimiento precoz de la urgencia médica y llamada de auxilio ¿como?

RCP precoz realizada por testigos

Desfibrilación precoz

Soporte Vital Avanzado y cuidados post-RCP

IMPORTANCIA DE LA LLAMADA



▶ **Nombre**

▶ **Donde estoy**

(calle, N°, comuna, referencias)

▶ **Qué está pasando**

Paro cardiorespiratorio ó Paro

▶ **Qué voy a hacer**


Iniciar maniobra de reanimación ó RCP

RCP

Reanimación CardioPulmonar

INICIAR COMPRESIONES TORÁICAS


- ▶ Arrodillarse al lado de la víctima
- ▶ Talón de una mano en centro pecho (esternón). Talón otra mano encima.
- ▶ Entrelazar los dedos.
(3er dedo mano de debajo encima de pezón aprox)



30 COMPRESIONES TORÁICAS

- ▶ Brazos rectos.
- ▶ Compresión torácica:
 - ▶ **Ritmo 100cpm a 120cpm**
 - ▶ **Profundidad 5cm**
 - ▶ Igual tiempo de compresión y de descompresión

Reducir al máximo las interrupciones de las compresiones torácicas



RCP

Reanimación CardioPulmonar

2 VENTILACIONES DE RESCATE

- ▶ Abrir vía aérea (maniobra frente-mentón)
- ▶ Pince nariz
- ▶ Permita que boca se abra, pero mantenga mentón elevado
- ▶ Inspire y coloque sus labios alrededor de la boca
- ▶ En caso de ser una persona desconocida y no desea tener contacto boca-boca, puedes realizar sólo compresiones



CONTINUAR RCP HASTA QUE...



- ▶ Llegue y le reemplace ayuda profesional o alguien que maneje la técnica
- ▶ Víctima comience a despertar, abra los ojos o respire normalmente
 - ▶ Si está acompañado intercambiar posición cada 5 ciclos

RCP

Reanimación Cardio Pulmonar



CADENA DE SUPERVIVENCIA Menores de 8 años

Cadena de Supervivencia de Lactantes y Niños

1. Si está solo practique RCP cinco ciclos o dos minutos. 30:2
2. Luego active el sistema de emergencias – **131**
3. Continúe con RCP



RCP

Reanimación Cardio Pulmonar Lactante

REPETIR EL CICLO 30: 2 → **5 VECES**

* Si ya se hizo el llamado y está acompañado realizar 15:2 (15 compresiones y 2 ventilaciones)

30

COMPRESIONES



2

VENTILACIONES



VENTILACION



Ventilación: BOCA a BOCA - NARIZ